

# RIESGOS ESTÉTICOS

En promedio, una cirugía profesional tiene un costo aproximado de 3 mil 500 dólares. En México, se calcula que en 2010 más de 85 mil pacientes se sometieron a un tratamiento para aumentarse los senos

## El problema

Los implantes fueron fabricados con un gel de silicona no autorizado. Por eso recomiendan a las portadoras una mamografía, una tomografía axial computarizada o la resonancia magnética. para descartar que se hayan roto



◀ Implante normal




◀ Implante roto

La rotura de un implante puede ser intracapsular o extracapsular, lo cual producirá una liberación menor o mayor del contenido. Las extracapsulares tienen alto potencial de captación linfática de la silicona pudiendo derivar en granulomas y/o adenopatías axiliares o en el área torácico-mamaria. Según especialistas, 75% de las rupturas son intracapsulares y 25% extracapsulares

## Así se coloca

- 1 El paciente se anestesia de manera local
- 2 Se realiza una incisión por la que se introduce el implante
- 3 La prótesis se coloca detrás del músculo pectoral



**¿Dónde acudir en caso de dudas de la prótesis PIP?**  
 Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. amcper01@gmail.com Teléfono: 5615 4911